


***Parategastes pholpunthini* Saetang & Maiphae, 2015**

โคพีพอดชนิดใหม่จัดอยู่ในวงศ์ Harpacticoida พบเป็นครั้งแรกของโลก ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2556 บริเวณปากคลองบ้านกลาง ทะเลน้อย จังหวัดพัทลุง มีลักษณะเด่น คือ ลำตัวของเพศเมียและเพศผู้ มีลักษณะแบนด้านข้าง และมีผิวขรุขระตลอดทั้งลำตัว หนวดคู่ที่ 1 ในเพศเมียมี 6 ปล้องและเพศผู้มี 8 ปล้อง ในเพศเมีย ซีตีสั้นตรงกลางของเอ็กโซพอดในปล้องที่ 3 ของขาคู่ที่ 4 มีขนาดใหญ่มากเมื่อเทียบกับซีตีสั้นอื่นในปล้องเดียวกัน ตรงกลางค่อนไปทางปลายของซีตีสั้นนี้มีหนามเล็กๆ ยื่นออกมา 2 อัน และบริเวณปลายมีหนามขนาดเล็กแยกออกเป็น 3 อัน ขาคู่ที่ 5 ประกอบด้วยเบซิทีเอ็นโดพอดและเอ็กโซพอด 1 ปล้อง โดยหนามด้านในของเบซิทีเอ็นโดพอดมีขนาดยาวเป็นสองเท่าเมื่อเทียบกับหนามด้านนอก ขาคู่ที่ 5 ในเพศผู้ ประกอบด้วยเบซิทีเอ็นโดพอดและเอ็กโซพอด 1 ปล้อง โดยเอ็กโซพอดมีความยาวมากเมื่อเทียบกับเบซิทีเอ็นโดพอด ขอบด้านนอกของปล้องมี 1 ซีตีสั้น บริเวณตรงกลางค่อนไปทางปลายของปล้อง มี 1 ซีตีสั้น และบริเวณปลายสุดของปล้อง มีหนาม 2 อัน



Parategastes pholpunthini sp. n., holotype female. A habitus, lateral view
 B rostrum C caudal ramus, lateral view D urosome. Scale bars: A, B = 100 μ m;
 C, D = 50 μ m.

